

	der Thrombozyten			
Clopidogrel	(biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten	7-10 Tage	Nach Entfernung	
Ticlopidin	(biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten	7-10 Tage	Nach Entfernung	
Prasugrel	(biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten	7-10 Tage	6h nach Entfernung	
Ticagrelor	7-8,5 h (CAVE: aktiver Metabolit 5 d)	5 Tage	6h nach Entfernung	
Cangrelor (30 µg/kg i.v. → 4µg/kg/min i.v.)	3-6 min (vollständige Erholung der Thrombozyten -fkt nach 1 h)	1h	8-12 h	
Abciximab	12-24h (biologische HWZ)	Kontraindi- kation für Katheteran- lage/ 48h vor Katheter- entfernung	8h nach Entfernung	(‡)
Eptifibatid/ Tirofiban	2-2,5h \$	Kontraindi- kation für Katheter- anlage/ 8-10h	8h nach Entfernung	(‡)
Dipyridamol	13-19 h (vollständige Erholung der Thrombozytenf- kt nach 2-10d)	7-10 d	5-6h nach Entfernung	
Cilostazol	21h	42h	5h	
Iloprost	30min	2h	8h	(‡)
Epoprostenol	2-6min	mindesten s 12 min	8h	(‡)

Tabelle 5: Empfohlene Zeitintervalle vor und nach rückenmarknaher Punktion bzw. Katheterentfernung